Literaturbericht.

Journal de Conchyliologie. 3ᵉ Serie. Tome XX. Vol. XXVIII.

p. 5. *Morelet, A.*, la Fauna malacologique du Maroc. Mit 3 Tafeln. Der Verfasser gibt in dieser hochinteressanten Arbeit eine Aufzählung der gegenwärtig aus Marocco bekannten Arten, mit Abbildung der noch weniger bekannten und neuen. Es sind 131 Arten, davon neu Hel. sultana, kaum von scabriuscula zu unterscheiden (ob nicht vielleicht in alter Zeit vom Eryx nach Tetuan verschleppt?), Turricula Hesperidum, das Analogon der orientalischen crenulata Oliv., Xerophila dumivaga, an die Maderenser armillata erinnernd, Hydrobia gracilis. Von wenig bekannten Formen werden abgebildet Helix Coquandi Morel., Hel. vermiculosa Morel., Hel. Dehnei Rossm., die verschollene Hel. subdentata Fér., Hel. conopsis, ein interessantes Mittelglied zwischen Turricula und Xeroleuca, Hel. finitima Morel., Cottyi Morel., Gonostoma maroccana, calpeana, sowie einige prächtige Varietäten von Hel. pisana und eine Anzahl Formen von Melanopsis tingitana. Auffallend ist das Vorkommen von Claus. plicata. Mit den Canaren gemeinsam sind nur zwei Arten, Hel. Lancerottensis und argonautula.

p. 83. *Fischer, P.*, sur les conditions d'existence de l'Ostrea angulata Lam. — Eine Anzahl Exemplare dieser Art wurden als abgestorben von einem Austernschiff an der Mündung der Gironde über Bord geworfen und veranlasste die Bildung einer reichen Austernbank innerhalb weniger Jahren; die Brut hat seit 1866 sich überall in der Umgegend angesetzt, und zwar mit Vorliebe in der Litoralzone, welche bei jeder Ebbe trocken läuft.

p. 86. *Oehlert, D.*, les Brachiopodes Siluriens de la Bohème d'après les travaux de M. Barrande.

p. 96. *Tournouer, R.*, Conchyliorum fluviatilium fossilium in stratis tertiariis superioribus Rumaniae collectorum, novae species. — Neu Paludina Crajovensis, Emmericia rumana, Melanopsis rumana, Unio Crajovensis, Iconomianus, Porumbari, Jiulensis.

Jahrbücher der deutschen Malacozoologischen Gesellschaft. VII. 1880. Heft 1.

p. 1. *Kobelt, W.*, die geographische Verbreitung der Mollusken. III. Die Inselfaunen (Forts.).

p. 31. *Böttger, Dr. O.*, zur Molluskenfauna der Schweiz.

p. 40. *Weinkauff, H. C.*, Catalog der Gattung Marginella Lam.

p. 65. *Kobelt, W.*, Excursionen in Süditalien (Forts.).

p. 78. *Löbbecke et Kobelt*, Museum Löbbeckeanum. (Mit Taf. 2 u. 3). Neu Fusus Löbbeckeanus.

Paulucci, *M.*, *Fauna malacologica delle Calabria. Specie terrestri e fluviatili, enumerate e descritte da . . . .* — Firenze 1879. Con 10 tavole.

Wir kommen auf dieses schöne der Verfasserin Ehre machende Werk ausführlicher zurück.

Esmark, *Birgithe*, *Bidrag til Kundskaben om Adbredelsen af Norges Land- og Ferskvandsmollusker i forskjellige Egne af Landet.* — In Nyt Magazin for Naturvidensk. XXV. 3. p. 215.

Neu Hyalina Norvegica: testa convexa pellucida, nitida, subviridis, et regulariter striata; anfr. $4^1/_2$—5, ultimus non descendens; spira convexa; umbilicus latus; sutura profunda; apertura rotundato-lunaris. — Diam. 7—$7^1/_2$, alt. $3^1/_4$ – $3^3/_4$ mm. Hab. Langesund.

Bergh, *Dr. Rud.*, *Beiträge zu einer Monographie der Polyceraden.* I. Mit 6 Tafeln. — In Verh. zool. bot. Gesellschaft. Wien 1879. p. 599.

Umfasst die Gattungen Polycera Cuv. (incl. Palio Gray), Euplocamus Phil. und Plocamopherus Leuck. — Neu Eupl. japonicus.

Sitzungsbericht der Gesellschaft naturf. Freunde, Berlin. No. 2.

p. 44. *Reinhardt*, *Dr. O.*, Nachtrag über die Orcula-Arten. — Pupa Moussoni n. sp. von Aleppo.

p. 45. — über die Acme-Arten des Banats und Siebenbürgens. Neu Acme perpusilla und similis.

Martini-Chemnitz, Conchylien-Cabinet. II. Ed.

Lfg. 286. Marginella, von *H. C. Weinkauff* (Schluss).

Lfg. 287. Cypraea, von *H. C. Weinkauff*. — Neu C. subteres t. 8 fig. 4.

Lfg. 288. Avicula, von *W. Dunker* (Schluss). Neu Av. Jeffreysii Dkr. t. 24 fig. 5 von Guinea, Av. bicolor t. 24 fig. 7 unbekannten Fundortes; Av. fluctuosa t. 25 fig 2, ebenfalls unbekannten Fundortes. — Ausserdem liegen die Tafeln 1—3 von VIII. 3. a. Lithodomus bei.

Granger, *Albert*, *les Coquilles rares.* — In Le Naturaliste No. 23 ff.

Enthält Betrachtungen über seltene Arten, Pleurotomaria (der Autor kennt von den vier beschriebenen lebenden Arten nur zwei), Conus, Rostellaria, Cancellaria etc.

Westerlund, C. Ag., et Blanc, Hippolyte, Aperçu sur la Faune Malacologique de la Grèce, inclus l'Epire et la Thessalie. Coquilles extramarines. — Naples 1879.

Die Herren Verfasser haben in sehr anerkennenswerther Weise und mit grosser Sorgfalt alle in der Literatur zerstreuten Notizen über die Fauna der südlichen Balkanhalbinsel zusammengetragen und die zahlreichen Arten hinzugefügt, welche Herr Blanc auf seinen verschiedenen Reisen gesammelt, sowie die sehr reiche und wichtige Ausbeute der Frl. Jos. Thiesse in Chalkis. Trotzdem Westerlund in vielen Fällen von seiner früheren Artzersplitterung zurückgekommen — z. B. bei Glandina algira, Hel. Codringtonii etc., — werden doch bereits 326 Arten aufgeführt, eine Zahl, die einer beträchtlichen Vermehrung fähig wäre, wenn die gebirgigen Districte Thessaliens und Macedoniens genauer erforscht wären. Als neu beschrieben werden Hyalinia lamellifera Blanc von Creta, mit zwei zahnartigen Lamellen an der Mündung, Zonites cretensis Blanc, wohl richtiger zu Hyalina zu stellen, Helix rupestris var. chorismenostoma, die bereits von Roth erwähnte Form von Syra mit gelöstem letztem Umgang; Hel. lens var. piligera Blanc von Euböa und var. callojuncta von Lepanto; Hel. cantiana var. messenica von Kalamata; Eulota interpres Westerl. von Euböa; Hel. olympica var. sciara West. vom Olymp; Campylaea Westerlundi Blanc von Creta; Pseudoxerophila bathytera Blanc von Creta, suspecta Westerl. von dort; Xerophila cauta Westerl. = cretica Roth nec Fér., von Athen; — Hel. chalcidica var. didyma Westerl. von Euböa; syrosina Bgt. von Syra und milosina Bgt. von Milo; hellenica Bgt. von Euböa, mesostena Westerl. von Creta; eugoniostoma Bgt. von Syra, Hel. Thiesseana var. pronuba Westerl. von Creta und var. nupta von ebenda. — Buliminus dirphicus Blanc von Euböa, Thiesseanus Mouss. von ebenda und aus Böotien; Claus. furcilla Westerl. von Patras; Bithynia graeca Westerl. von Lepanto; Hydrobia declinata var. sorella Westerl. aus Nordeuböa; Pyrgula Thiesseana var. filicostata Westerl. von Missolunghi; Unio Vescoi var. Conemenersi Bl. von Prevesa; Unio desectus Drouët von Volo; U. vicarius West. aus dem Sperchius. Die ganze Arbeit ist eine sehr wichtige Bereicherung der europäischen Fauna und jedem unentbehrlich, welcher sich eingehender mit derselben beschäftigt.